

Informasjon fra Smittevernseksjonen

## **Screening av pasienter for VRE, ESBL og MRSA**

Smittevernseksjonen minner om at pasienter som har vært til behandling/innleggelse i helseinstitusjon utenfor Norge de siste 12 måneder skal screenes for vankomycinresistente enterokokker (VRE) og ekstendert spektrum betalaktamase (ESBL)-produserende bakterier, samt MRSA, hvis de skal til innleggelse ved et norsk sykehus.

### **Prøvetaking for screening av VRE/ESBL:**

Det tas prøve fra rektum innenfor analåpningen eller fra fæces: Bruk eSwab med hvit kork. Penselen må være synlig tilsølt med fæces. En prøve er nok.



### **Screening av pasienter for MRSA**

Det er **ingen endring i regler for screening av MRSA**, dvs at det fortsatt ønskes screening for MRSA før innleggelse eller poliklinisk undersøkelse. Prøve tas med eSwab med hvit kork fra nese, hals, perineum og eventuelle sår. Urinprøve tas hvis pasienten har kateter.

Personer som er bærere av resistente mikrober har krav på helsetjenester på lik linje med andre pasienter, men dersom slikt bærerskap er kjent tas det spesielle smittevernhensyn ved undersøkelse og behandling.

For mer informasjon om MRSA, VRE og ESBL-produserende bakterier, se Folkehelseinstituttets [Smittevernbok](#)

Har du spørsmål? Send mail: [smittevern@ahus.no](mailto:smittevern@ahus.no) eller ring: 6796 4400